

ព្រឹត្តិបត្របច្ចេកទេស លេខ ៧៧


ការត្រួតពិនិត្យថ្នាលបណ្តុះកូនឈើ

ការរៀបចំថង់

នៅពេលធ្វើការបណ្តុះកូនឈើ ការពិចារណាឬអនុវត្តតាមជាជំហានៗឱ្យបានត្រឹមត្រូវ គឺជាការសំខាន់ សូមមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោម(រូបភាពទី១) ៖

១. ដីច្រកក្នុងថង់មិនបានពេញល្អ មាត់ថង់រមួរចូល ធ្វើឱ្យការស្រោចទឹកមិនបានសព្វល្អ ។
២. ឬសកូនឈើរួញ នាំឱ្យងាយដួលរលំដោយសារខ្យល់បោកបក់នៅពេលវាធំ ។
៣. កូនឈើស្លុងមិនចំកណ្តាលថង់ ។
៤. ដីច្រកក្នុងថង់មិនបានណែនល្អ ។
៥. ដីក្នុងថង់ណែនជ្រុល ។
៦. រៀបចំលាយដីមិនបានល្អ ។
៧. កូនឈើក្នុងថង់ដុះបានល្អបំផុត ។

រូបភាពទី១



ចំណាំ៖ ល្បាយដីគួរមាន ១ភាគ៣ជាកំប៉ុស្តិ៍ ១ភាគ៣ជាដីខ្សាច់ និង ១ភាគ៣ជាដីនៅក្នុងភូមិ ។

ការសង្កេតស្មៅ



សូមស្រោចទឹកថ្នាលឱ្យបានជោក មុននឹងបោចស្មៅ ។ ដកស្មៅដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយដៃរបស់អ្នក ហើយស្រោចទឹកម្តងទៀតបន្ទាប់ពីដកស្មៅរួច ។

រៀបចំថង់កូនឈើដែលបានច្រកដីរួច និងស្រោចទឹកវា ២សប្តាហ៍ មុនពេលដាក់គ្រាប់ចូលទៅក្នុងថង់ ដើម្បីឱ្យស្មៅដុះចេញមក ហើយធ្វើការដកស្មៅចេញដោយមិនមានការរំខានដល់កូនឈើ ។


ការរៀបចំតាមលំដាប់ថ្នាក់



រៀបកូនឈើតាមលំដាប់ថ្នាក់(តូច-ធំ) ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដល់ការលូតលាស់របស់កូនឈើ ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះត្រូវយកកូនឈើដែលក្រិន មានជម្ងឺ និងទន់ខ្សោយចេញ ហើយជ្រើសរើសយកតែកូនឈើណាដែលមានសុខភាពល្អ និងរឹងមាំដើម្បីយកមកពង្រឹងដើមនិងដាំ ។ វិធីសាស្ត្រនេះនឹងធ្វើឱ្យអត្រារស់នៅក្រោយពេលដាំមានកម្រិតអតិបរមា ។



ការពង្រឹងដើម



ការពង្រឹងដើមនៃកូនឈើ ជាដំណើរការបន្តកូនឈើពីលក្ខខណ្ឌ ងាយស្រួលនៅក្នុងផ្ទាល់ ទៅលក្ខខណ្ឌលំបាកជាក់ស្តែងស្រដៀងនឹង តំបន់ព្រៃវិវាទដែលត្រូវដាំឡើងវិញ ។ បើសិនជាកូនឈើទាំង នោះមិនរឹងមាំ និង មិនធន់ទ្រាំទៅនឹងលក្ខខណ្ឌក្តៅស្ងួតក្រោមកំដៅព្រះ អាទិត្យនៅតំបន់ដាំកូនឈើទេ កូនឈើនឹងអន់ខ្លាំងហើយងាប់ក្រោយ ពេលដាំ ។


ប្រហែលជា៣ខែមុនពេលដាំ ត្រូវផ្ទេរកូនឈើដែលត្រូវដាំពីរង បណ្តុះកូនឈើ ទៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីធ្លានៃផ្ទាល់ ហើយ ម្តងម្កាលបន្តិចៗ បន្ថយគម្របម្រប់ដើម្បីឱ្យកូនឈើស្តាំនឹងពន្លឺថ្ងៃ និងស្រោចទឹកឱ្យបានញឹកញាប់ ។ នៅខែចុងក្រោយមុនពេលដាំ កូនឈើទាំងអស់នោះត្រូវនៅស្ថិតនៅកណ្តាលវាលក្រោមពន្លឺថ្ងៃពេញលេញ ។

ការចម្រុះប្លង់កូនឈើ

កាត់ប្លង់កូនឈើដែលដុះចេញខាងក្រៅចង់ផ្លាស់ទី ដើម្បី ការពារកូនឈើកុំឱ្យចាក់ប្លង់ចូលក្នុងដី ដែលធ្វើឱ្យ ពិបាកដកយកមកដាំ ។ សូមចាប់ផ្តើមពិនិត្យប្លង់កូនឈើ ពេលវាមានអាយុបាន ៣ខែ ។



គម្លាតកូនឈើ



រៀបចំកូនឈើឱ្យមានគម្លាតពីចង់មួយទៅចង់មួយទៀត ធំជាងមុន ។ គម្លាតធំធ្វើឱ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យចូលបានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីសម្លាប់បាក់តេរី និង ជម្ងឺផ្សិត ជួយធ្វើឱ្យកូនឈើមានសុខភាពល្អ ដើមធំ ហើយរឹងមាំជាងមុន និង ចៀសវាងមិនឱ្យកូនឈើខូចទ្រង់ទ្រាយដើមរបស់វា ។

កម្ពុជាហាវែស
ផ្ទះលេខ ៤៦ ផ្លូវ ៣១០ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន
ក្រុងភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩៦ ៤១៩
harvest@fintrac.com

ព្រឹត្តិបត្រនេះរៀបចំឡើងក្រោមការឧបត្ថម្ភពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកតាម រយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (USAID) ។ ខ្លឹមសារនៅក្នុងឯកសារនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្វីនត្រាក់ Fintrac Inc. និងមិនបានផ្ទុះបញ្ជាំងពីទស្សនៈរបស់ USAID ឬ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយ ។